

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NỘI SOI UNG THƯ SỚM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TRÊN Ở VIỆT NAM

TS.BS Thái Doãn Kỳ

Ung thư sớm đường tiêu hóa trên, bao gồm ung thư thực quản và ung thư dạ dày giai đoạn sớm, có thể được điều trị hiệu quả bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (EMR/ESD). Đây là các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giúp loại bỏ tổn thương một cách triệt để, bảo tồn ống tiêu hóa và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Tại Việt Nam, mặc dù số ca phát hiện ung thư sớm đang tăng lên nhờ sự phát triển của nội soi chẩn đoán, việc áp dụng rộng rãi phương pháp ESD vẫn còn gặp nhiều thách thức do hạn chế về nhân lực, trang thiết bị và hướng dẫn điều trị thống nhất. Liên chi Hội nội soi tiêu hóa Việt Nam (VFDE) đưa một số khuyến nghị về can thiệp nội soi điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa trên tại Việt Nam.

VIETNAMESE GUIDELINES FOR ENDOSCOPIC TREATMENT OF EARLY UPPER GASTROINTESTINAL CANCER

Thai Doan Ky

Early upper gastrointestinal cancer, including early-stage esophageal and gastric cancer, can be effectively treated using endoscopic mucosal resection (EMR) and endoscopic submucosal dissection (ESD). These minimally invasive techniques allow for complete lesion removal, preservation of the digestive tract, and improved patient quality of life.

In Vietnam, although the detection rate of early cancer is increasing due to advancements in diagnostic endoscopy, the widespread adoption of ESD remains challenging due to limitations in human resources, equipment, and standardized treatment guidelines. The Vietnam Federation for Digestive Endoscopy (VFDE) has provided several recommendations regarding endoscopic interventions for the treatment of early upper gastrointestinal cancer in Vietnam

